PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-113531

(43) Date of publication of application: 27.04.1999

(51)Int.CI.

A23L 1/30

C08B 37/00

// A61K 31/715

A61K 35/74

A61K 35/84

(21) Application number: **09-320233**

(71)Applicant: HUDSON SHOJI KK

(22) Date of filing:

17.10.1997

(72) Inventor: UEDA TAKUICHI

KANDA TATSUYA CHINNAI NAOKI

(54) HEALTH FOOD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a health food for persons having solid cancers or tumors or desiring the inhibition of the generation of the tumors, while the functions of conventional health foods are insufficient and while the persons require even a little higher medical effect. SOLUTION: This health food comprises 4.5 g of the active ingredients of a mixture comprising a mannan polysaccharide originated from Agaricus blazei and a modified hemicellulose having xylose in the main chain and an arabionose polymers on a side chain and a Lactobacillus brevis sub-species coagulans- containing material containing =300,000,000 Lactobacillus brevis sub-species coagulans bacteria. The mannan polysaccharide is contained in an amount of 20-70 wt.% based on the total amount of the mannan polysaccharide and the modified hemicellulose. Three of the raw materials are preferably liquid or powdery, or two of the raw materials are preferably liquid and the other is powdery, from the viewpoints of profitability and supply.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]



[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-113531

(43)公開日 平成11年(1999)4月27日

(51) Int.CL*	鐵別記号	FI		
A23L 1/	•	A 2 3 L 1/30 Z		
C08B 37/	00	C 0 8 B 37/00 Q		
// A61K 31/	715 ADU	A 6 1 K 31/715 ADU		
35/	74 ABD	35/74 ABDA		
35/	84	35/84 A	A	
,		審査請求 未請求 請求項の数3 書面 (全 9	頁)	
(21)出願番号	特顏平9-320233	(71) 出顧人 597163278		
		ハドソン商事株式会社		
(22)出顧日	平成9年(1997)10月17日	大阪府大阪市中央区北浜1丁目5番7	_	
(22)川殿口	一元5千(1551/10月17日		73	
	•	(72)発明者 上田 卓一	_	
		大阪府大阪市中央区北浜1丁目5番7	号八	
	•	ドソン商事株式会社内		
·		(72)発明者 神田 龍也		
	•	和歌山県西牟婁郡串本町串本1908番地	の1	
		ユウキ株式 会社内		
		(72)発明者 陳内 直樹		
	•	大阪府大阪市中央区北浜1丁目5番7	長ハ	
		ドソン商事株式 会社内	. , , ,	
•	·	I S S WARM TITLE		

(54)【発明の名称】 健康食品

(57)【要約】

【課題】 固型癌や腫瘍を持つかその腫瘍の発生を抑制 せんとする人のための健康食品の機能は十分でなく、少しでもより高い効能が求められている。

【解決手段】 ヒメマツタケ由来マンナン多糖体及び、主鎖にキシロース、側鎖にアラビノース重合体を有する変性へミセルロースの合計重量につき、重量比でヒメマツタケ由来マンナン多糖体を20%~75%の範囲で含有させた混合物の有効成分4.5g当り、ラクトバチルスブレービス サブスピーシーズ コアグランスを3億以上を含むラクトバチルス ブレービス サブスピーシーズ コアグランス含有物を混合して成る健康食品を作った。この素材は経済性や供給上の観点から3素材共液体か粉体または2素材が液体で他は粉体であるのが良い。

9巻、第5号)

上誌、第127巻、第4号)

【特許請求の範囲】

【請求項1】ヒメマツタケ由来マンナン多糖体含有物及 び、主鎖にキシロース、側鎖にアラビノース重合体を有 する変性へミセルロースの含有物との混合物を、両者の 有効成分、即ちヒメマツタケ由来マンナン多糖体及び、 主鎖にキシロース、側鎖にアラビノース重合体を有する 変性へミセルロースの合計重量につき、重量比で、ヒメ マツタケ由来マンナン多糖体を20%~75%の範囲で 含有させて作った混合物の有効成分4.5g当り、乳酸 菌の一種であるラクトパチルスブレーピス サブスピー 10 シーズ コアグランスを3億以上を含むラクトバチルス ブレービス サブスピーシーズ コアグランス含有物 を混合して成ることを特徴とする健康食品。

【請求項2】請求項1における、配合する各素材、ヒメ マツタケ由来マンナン多糖体含有物と、主鎖にキシロー ス、側鎖にアラビノース重合体を有する変性へミセルロ ースの含有物、及びラクトパチルス ブレーピス サブ スピーシーズコアグランス含有物の全てが液体である か、2素材は液体、他は粉体であることを特徴とする、 健康食品。

【請求項3】請求項1における配合する各素材が3素材 とも、それぞれ粉体であることを特徴とする健康食品。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、腫瘍を発症した患者、 または腫瘍の発生に対する免疫力を高めようとする人に 適する健康食品を提供せんとするもので、健康食品を使 用するもの、また、健康食品製造業や健康食品の提供を 業とする者の利点に関する。

[0002]

【従来の技術】固型癌や腫瘍を治療中の人、またはこれ 等を予防しようとする人に向いた健康食品が幾つか知ら米 *れている。例えば下記の諸報文等により、ハラタケ属に 属するヒメマツタケ(和名:カワリハラタケ、学名:ア ガリクス プラゼイ ムリル)の菌糸体、または子実体 を溶媒で抽出した多糖体(製法は例えば特公昭61-4 7518)が抗腫瘍効果や予防効果を有することは知ら れており、これを用いた健康食品も製造されている。 【0003】・「ヒメマツタケ由来・抗腫瘍性多糖体に よる細網内皮系機能の活性化」…(医学と生物学、10

【0004】・「ヒメマツタケ脂質画分の抗癌活性とマ クロファージ活性」…(同上誌、第112巻、第1号) 【0005】・「ヒメマツタケ由来多糖体の前投与によ るハツカネズミ Sarcoma-180固型癌に対す る抗腫瘍効果」… (同上誌、第114巻、第4号) 【0006】・「細網内皮系活性作用よりみたヒメマツ タケの経目投与による投与スケジュールの検討」…(同

[0007] · [ヒメマツタケAgaricus bl (岩出101株)より分離した新規多糖-タ 27 e i 20 ンパク複合体 (ATOM) の担ガンマウスにおける抗腫 瘍効果とその作用機作…(ANTICANCER RE SEARCH、第17巻)

【0008】また、主鎖にキシロース、側鎖にアラビノ ース重合体を有する変性へミセルロース含有物は米糠の へミセルロースを基質として用い、茸由来の複数の炭水 化物分解酵素を反応させることにより得られる変性へミ セルロースを主な成分とし、その化学構造は化1に示す ように、主鎖にキシロース、側鎖にアラビノースの重合 体を有するアラビノキシランであり、既に健康食品とし 30 て用いられている。

[0009]

[化1]

主假にキシロースに領領にアラピノース重合体を「

【0010】 この効果については「ABSTRACT BOOK MGN-3 (Arabinoxylane Compound)」等で既に公知となっている。 【0011】更に、乳酸菌の1種、ラクトバチルス ブ レーピス サブスピーシーズ コアグランスを高濃度 (5億/g)で含有する健康食品が発売されており、そ 50 ている(特許第2051579)。しかし、これ等の各

の効能については「ラブレ菌の INF-α産生能への影 響」(京都パストゥール研究所研究報告 94.5・6 号) や「ラクトバシラス・ブレビス (ラブレ) 菌の機能 とその利用」(食品と開発、第29巻、第8号)等で公 知となっており、当該菌含有物そのものは特許も取得し

3

累材の健康食品の機能をもってしても、固型癌や腫瘍を 持つ患者または肺瘍の発生を抑制せんとする人への効能 は十分と言うには違く、より高い効能を持つ食品の出現 が待たれていた。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】上述のように、これまでさまざまな健康食品が固型癌や腫瘍を持つ患者または腫瘍の発生を抑制せんとする人のために市販されて来ているが、その機能は十分でなく、少しでもより高い効能が求められており、上記の3素材も、個々では、十分な 10 抗癌・抗腫瘍効果または腫瘍の発生を予防・抑制する作用を発揮することが出来なかった。これ等各健康食品を混合して素材として使用すれば、各素材が本来的に持っている機能を相乗的に発揮されることが予想されたが、具体的な配合方法は未知であった。

[0013]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載した構成素材の有効成分のうち前二者、即ちヒメマツタケ由来マンナン多糖体、及び主鎖にキシロース、側鎖にアラピノース重合体を有する変性へミセルロースが癌の予防や直20接抗腫瘍効果を持つのに対し、後者即ち、ラクトバチルスプレーピスサブスピーシーズコアグランスは摂取者のインターフェロン産生能を高めることが主たる効能であり、前二者と後者の間に、機能に少しニュアンスがある。発明者らは前二者を混合する時の適正配合を実

験により特定した。更にこの混合物に、適正量の後者を加えれば、インターフェロンの機能が加わり、従来の医薬・健康食品では十分ではない、腫瘍の治療や癌・腫瘍を含む病気への免疫・インターフェロンによる予防能力を持つ、健康な身体をつくる上で大きな寄与をなすことになる。

【0014】発明者らは前二者、即ちヒメマツタケ由来マンナン多糖体と主鎖にキシロース、側鎖にアラビノース重合体を有する変性へミセルロースの混合物において、ヒメマツタケ由来マンナン多糖体含有率を0%、25%、50%、75%、100%と変化させ、これを腫瘍細胞、Sarcoma-180(以下S-180と略称する)を移植したラット(ICR、雄、6~8週齢)に、S-180移植の10日前から、ラットの体重1kg当り0.04g/日を経口投与して60日間観察し、60日後の腫瘍の大きさを測定した。

【0015】その結果、表1、表2、表3、表4及び表5に示すようにヒメマツタケ由来マンナン多糖体0%の時の平均発生腫瘍面積と各場合のそれとを比較した時、ヒメマツタケ由来マンナン多糖体含有率25%~75%に於て、95%以上の信頼度をもって発生率が少ないという帰無仮説が成り立つことが判った。

[0016]

【表1】

國裏面積比較山と解析方法

実験番号: QMO:A100)、ヒメマツタケ由来マンナン多額体:0%、 主顧にキシロース、例顧にアラビノース選合体を有する変性へミセルロース:

		投与量(0.	04g	/k
國旗長cm	随海県C ID	用热面積cm²		
1. 8	1. 5	2. 70		
2. 1	1. 2	2.52		
1. 7	1. 7	2.89		
1. 7	1. 6	2.72		
1. 8	1. 7	3.06		
1. 7	1. 5	2. 55		
2. 1	1. 7	3. 57		
1. 6	1. 3	2.08		
1. 8	1. 8	3. 24		
1. 9	1. 7	3. 23		
2. 1	1. 6	3.36		
1. 9	1. 7	3.23		
1.8	1. 6	2.88		
1. 7	1. 3	2. 21		
1. 9	1. 4	2.66		
2. 3	1.8	4. 14		
1. 7	1.5 .	2. 55		
1. 8		2.70		
1. 6		2.56		
n				
x				
σ×				
σ x-1				
$s^2 = \sigma_{x-1}$	z = 0.23	8.6		
	1. 8 2. 1 1. 7 1. 7 1. 8 1. 7 2. 1 1. 6 1. 8 1. 9 2. 1 1. 9 1. 8 1. 7 1. 9 2. 3 1. 7 1. 8 1. 9 1. 6 n x σ*	1. 8 1. 5 2. 1 1. 2 1. 7 1. 7 1. 7 1. 6 1. 8 1. 7 1. 7 1. 5 2. 1 1. 7 1. 6 1. 3 1. 8 1. 8 1. 9 1. 7 2. 1 1. 6 1. 9 1. 7 1. 8 1. 6 1. 7 1. 3 1. 9 1. 4 2. 3 1. 8 1. 7 1. 5 1. 8 1. 5 1. 9 1. 7 1. 6 1. 6 0 x 20 x 2. 90 a 0. 47 a 1. 6 1. 6	開露長cm 開露福cm 開露面積cm* 1. 8 1. 5 2. 70 2. 1 1. 2 2. 52 1. 7 1. 7 2. 89 1. 7 1. 6 2. 72 1. 8 1. 7 3. 06 1. 7 1. 5 2. 65 2. 1 1. 7 3. 57 1. 6 1. 3 2. 08 1. 8 1. 8 3. 24 1. 9 1. 7 3. 23 2. 1 1. 6 3. 36 1. 9 1. 7 3. 23 2. 1 1. 6 3. 36 1. 9 1. 7 3. 23 1. 8 1. 6 2. 88 1. 7 1. 3 2. 21 1. 9 1. 4 2. 66 2. 3 1. 8 4. 14 1. 7 1. 5 2. 55 1. 8 1. 5 2. 70 1. 9 1. 7 3. 23 1. 6 1. 6 2. 56 n 20 x 2. 904 σ _{x-1} 0. 485	1. 8 1. 5 2. 70 2. 1 1. 2 2. 52 1. 7 1. 7 2. 89 1. 7 1. 6 2. 72 1. 8 1. 7 3. 06 1. 7 1. 5 2. 65 2. 1 1. 7 3. 67 1. 6 1. 3 2. 08 1. 8 1. 8 3. 24 1. 9 1. 7 3. 23 2. 1 1. 6 3. 36 1. 9 1. 7 3. 23 2. 1 1. 6 3. 36 1. 9 1. 7 3. 23 1. 8 1. 6 2. 88 1. 7 1. 3 2. 21 1. 9 1. 4 2. 66 2. 3 1. 8 4. 14 1. 7 1. 5 2. 55 1. 8 1. 5 2. 70 1. 9 1. 7 3. 23 1. 6 1. 6 2. 56 20 x 2. 904 σ _x 0. 473 σ _{x-1} 0. 485

*解析方法: Z=|x₁ -x₂ |/√(s₁²/n₁ +s₂²/n₂)による。

ここに、下サフィックスの1は、有効成分の全量が主質にキシロース、似額にアラビノース重合体を有する変性へミセルロース即ち、実験番号(M0:A100)の場合を表わし、下サフィックス2は、(M0:A100)のデータと比較する各場合であることを示す。

- *判定基準: ①Z≥2.575の時、「信頼度99%で有意」と言える。
 - ②2. 575>Z≥ 1. 960の時、「信頼度95%で有意」と言える。
 - ③1.960>Zの時、有意差なし。
- とし、①及び②の時、効果を認めるものとする。

[0017]

【表2】

國項面積比較20と解析

7

実験番号: (M25:A75)、ヒメマツタケ由来マンナン多緒体:25%、 主鎖にキシロース、傾鎖にアラビノース重合体を有する変性へミセルロース:

```
75%
                                   投与量(0.04g/kg日)
     No
          胆病長cm 胆瘍偏cm 胆瘍面積cm²
      1
            1. 8 1. 6
                             2.88
      2
            1. 7
                    1. 6
                             2.72
      3
            1. 7
                    1. 6
                             2.72
      4.
            1. 9
                    1. 3
                             2.47
      5
           . 1. 7
                    1. 7
                             2.89
      6
            1. 7
                    1. 7
                             2.89
      7
            2. 0
                    1. 2
                             2.40
      8
            1. 9
                    1. 2
                             2.28
      9
                    1. 4
            1. 8
                             2.52
    10
          . 1. 7
                    1. 7
                             2.89
    11
            1. 6
                    1. 6
                             2.56
    12
            ·1. 8
                    1. 4
                             2. 52
    13
            2. 0
                    1. 4
                             2.80
            1.8
    14
                   1. 5
                             2.70
    15
            1. 6
                   1. 6
                             2.56
    16
            1. 6
                   1.4
                            2. 24
    17
            1. 7
                   1. 5
                             2.55
    18
            1.8
                   1. 5
                             2.70
    19
            1.6
                   1. 6
                             2.56
    20
            1.4
                   1. 2
                             1.68
  個数
                     20
          n
  平均值
                      2. 577
          x
  標準偏差 σェ
                      0.280
          \sigma_{z-1}
                      0.287
  不僅分散 s^2 = \sigma_{n-1}^2 = 0.082
*解析計算: Z=|x<sub>1</sub> -x<sub>1</sub> |/√(s<sub>1</sub>²/n<sub>1</sub> +s<sub>2</sub>²/n<sub>2</sub>)
```

 $= (2.904-2.577) / \{ (0.236+0.082) \}$

/201 = 2.60: 故に、 Z≥2. 57.5

*判定

従って「信頼度99%で有意」と言える。

[0018]

【表3】 30

10

腫瘍面積比較(3)と解析

実験番号: (M50:A50)、ヒメマツタケ由来マンナン多糖体:50%、 主類にキシロース、側鎖にアラビノース重合体を有する変性へミセルロース: 50% 投与量(0.04g/kgH)

```
随穿長cm 随寫幅cm 随您而積cm*
      No.
      1
            1.6
                    1. 5
                             2.40
      2
            1.8
                    1. 5
                             2.70
      3
            1.8
                    1. 6
                             2.88
      4
            1. 5
                    1. 5
                             2. 25
      5
            1. 9
                    1.6
                             3.04
      6
            1. 7
                    1. 7
                             2.89
      7
            1.8
                             2. 52
                    1. 4
      8
            1. 7
                    1. 5
                             2. 55
      9
           1.6
                    1. 6
                             2.56
    10
            1. 7
                    1. 5
                             2.55
            1. 6
    1.1
                    1. 6
                             2.56
    12
            1. 7
                    1. 5
                             2. 55
    13
            1. 5
                    1. 4
                             2.10
    14
            1.6
                    1. 5
                             2.40
    15
            1.6
                    1. 4
                             2. 24
                             2.40
    16
            1.6
                    1. 5
                             2.72
    17
                    1. 6
            1. 7
    18
            1. 6
                             2.40
                    1. 5
    19
            1.6
                    1. 5
                             2.40
    20
            1.8
                    1. 5
                             2.70
  図数
                     20
          n
  平均值
          x
                       2.541
   概率偏差 σ.
                       0. 228
          σ x-1
                       0.234
  不偏分散 s^2 = \sigma_{x-1}^2 = 0.056
*解析計算: Z=|x<sub>1</sub> -x<sub>2</sub> |/√(s<sub>1</sub><sup>2</sup>/n<sub>1</sub> +s<sub>2</sub><sup>2</sup>/n<sub>2</sub>)
         = (2.904-2.541) / (0.236+0.056)
          /20} = 3. 00
*判定
       : 故に、2≥2. 575
        従って「信頼度99%で有意」と言える。
```

[0019]

【表4】

腫瘍面積比較4)と解析

実験番号: (M75:A25)、ヒメマツタケ由来マンナン多額体:75%、 主質にキシロース、側鎖にアラビノース配合体を有する変性へミセルロース: 25% 投与量(0.04g/kg日)

```
No
           服务是cm 服务偏cm 胚份面積cm²
      1
            1. 7
                    1.4
                             2.38
      2
            2. 0
                    1. 5
                             3.00
      3
            1.4
                    1. 4
                             1.96
      4
            1. 6
                    1. 4
                             2. 24
      5
            1.8
                    1. 5
                             2.70
      6
            1. 7
                    1. 3
                             2. 21
      7
            1. 7
                             2. 55
                    1. 5
                    1. 5
      8
            1. 9
                             2.85
      9
            1. 7
                    1.8
                             3.06
     10
            1.6
                    1. 5
                            2. 40
     11
            1. 6
                    1. 5
                             2.40
     12
            1. 8
                    1. 3
                             2.34
     13
            2. 1
                    1. 7
                             3.57
     14
            1. 5
                    1. 5
                             2. 25
    15
            1. 8
                   1. 6
                             2.88
    16
            1. 9
                    1. 6
                             3.04
    17
            2. 0
                    1. 5
                             3.00
    18
            1. 6
                             2. 24
                   1. 4
    19
            1. 8
                   1. 6
                             2.88
    20
            1. 5
                    1. 4
                             2.10
  個数
                     20
          n
  平均值
          x
                      2.603
   標準偏差 σ。
                      0.405
                      0.416
          \sigma_{z-1}
  不偏分散 s^2 = o_{x-1}^2 = 0.173
*解析計算: Z=|x<sub>1</sub> -x<sub>2</sub> | /√(s<sub>1</sub>*/n<sub>1</sub> +s<sub>2</sub>*/n<sub>3</sub>)
        = (2.904-2.603) / f(0.236+0.173)
          /20} =2. 10
```

*特定 : 故に、2. 575>Z≥ 1. 960 従って「信頼度95%で有意」と言える。

[0020]

30 【表5】

題協面積比較切と解析

実験番号 (M100:A0) ヒメマツタケ由来マンナン多糖体:100%、 主鎖にキシロース、倒鎖にアラビノース重合体を有する変性へミセルロース: 投与量(0,04g/kg用)

V 76			双与斌(U.	04g/kgB)
No.	胍腐長cm.	題瘍福c m	四級面積cm²	
1	2. 2	1. 5	3. 30	
2	1.8	1. 8	3. 24	
3	1. 9	1. 5	2.85	
· 4	1.6	1. 4	2. 24	
5	2. 0	1. 3	2.60	
6	2. 2	1. 9	4. 18	
7	1.8	14	2.52	
8	1. 7	1.6	2.72	
9	2. 0	1.6	3.20	
10	1. 7	1. 5	2. 55	
11	1. 9	1. 4.	2.66	
12	2. 0	1. 3	2.60	
13	2. 3	1. 7	3. 91	
14	1. 7	1. 6	2. 72	
15	1. 7	1. 7	2.89	
16	1.8	1. 4	2.52	
17	2. 0	1.8	3.60	
18	1. 5	1. 4	2. 10	
19	1. 9	1. 7	3. 23	
20	2. 0	1. 7	3. 40	
個数	n	20		•
平均值	x .	2.95		
標準偏差	Ø z	0. 53		
	σ x-1	0.54	-	
	$g^2 = \sigma_{x-1}$		_	
			$1^2/n_1 + s_2^2/n_2$)	
=			1/√{(0.236+	0. 295)
	/201 = 0			
*判定 : 前	(K. 1. 96	0>z		•

従って「有意差なし」と言える。

【0021】との解析には表1に示したような、推計学 30 効果を考慮して、従来、各素材が投与の目安として来た 的解析方法を用い、配合比を変えた各場合の計算結果は 表2、表3、表4及び表5に示した。これ等をまとめる と図1のようになり、判断基準を95%の信頼度とすれ ば、図1でデータを外挿予測すれば、ヒメマツタケ由来 マンナン多糖体含有率は20%程度でも効果が期待でき る。

【0022】更に前二者に、抗原が体内に入ると抗体が できて、一般の免疫作用が発現されるまでの間、身体を 保護する作用のある、インターフェロンの産生能を高め るラクトバチルス ブレーピス サブスピーシーズ コ 40 アグランス含有物を混合したものは、健康食品として当 然優れた効果が発現されることになる。

[0023]

【実施例】実施したラットによる実験では、ラットの体 重1kg当り0.04gのヒメマツタケ由来マンナン多 糖体と、主鎖にキシロース、側鎖にアラビノース重合体 を有する変性へミセルロースの混合物を投与したが、人 間の体重を平均60kgとしてこれを一日分の投与量と すれば、2.4g/日が投与量になる。しかし、ラット

5~6g/日よりは少ない量の、4.5g/日程度を目 安にできる。これに、ラクトバチルス プレーピス サ ブスピーシーズ コアグランスを、従来の摂取量の目安 である3億/日を加える製品などが、健康食品として望 ましい。

[0024]

【実施例】健康食品の製造コストの内、混合工程の費用 は大きい。特に、材料が顆粒や錠剤同士であれば、混合 のために粉砕工程が加わるので、コストは非常に大きく なる。当該の3素材、即ちヒメマツタケ由来マンナン多 糖体含有物、及び主鎖にキシロース、側鎖にアラビノー ス重合体を有する変性ヘミセルロースを含有する物質、 そしてラクトバチルス ブレービス サブスピーシーズ コアグランス含有物はそれぞれ、粉体、液体、顆粒、 錠剤での供給が可能であるが、発明者らは混合コストを 下げて、より廉価に商品化することを意図し、素材の形 態を定めるために小試験(混合に要する時間測定)を行 なった。その結果、混合コストが最も下がるのは、最も 速やかに均一に混合した、3素材とも液体の場合であ と人間との違いを考慮してこれよりは多く、また、配合 50 り、3 案材の内、2 案材を液体で供給し、これに粉体で

(9)

供給した他の1 索材を加えてブレンドする場合がとれに 次ぐことが判った。

15

[0025]

【実施例】また、1 素材をエキスで供給して他の2 素材を粉体とした場合、3 素材とも粉体で供給するよりも混合に時間が掛かることが判った。実際の市場では素材が液体で全て供給されるとは限らないので、3 素材とも粉体を用いる可能性があるが、発明者らは3 素材とも粉体を用いることも実用上可能であることを確認した。

[0026]

【発明の効果】ヒメマツタケ由来マンナン多糖体含有物、及び主鎖にキシロース、側鎖にアラビノース重合体を有する変性へミセルロースの含有物の混合物において、各素材の有効成分の重量の比率において、前者を20%~75%の範囲で含有する素材と、この2素材の混合物の有効成分4.5g当り、ラクトバチルス ブレービスサブスピーシーズ コアグランスを3億以上含有する素材を混合した本発明による、健康食品を摂取するこ*

*とにより、従来からある各索材の健康食品に比べて、抗 腫瘍効果、インターフェロンによる効果が発揮され、よ り優れた抗腫瘍効果や腫瘍発生予防作用をもたらすこと ができる。

16

【0027】また、配合する各案材、ヒメマツタケ由来マンナン多糖体含有物と、主鎖にキシロース、側鎖にアラビノース重合体を有する変性へミセルロースの含有物、及びラクトバチルス ブレービス サブスピーシーズ コアグランス含有物の全てが液体であるか、2素材10 は液体で他は粉体であるか、または3素材とも粉体で供給し混合する本発明により、廉価でこの健康食品を市場に出すことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実験結果(ヒメマツタケ由来マンナン多糖体と主鎖にキシロース、側鎖にアラビノース重合体を有する変性へミセルロースとの配合比率と、S-180を移植したラットに生じた腫瘍の面積との関係)である。

【図1】

